



第2類医薬品



発熱



鼻水



のどの痛み



さむけ

ゼリス葛根湯シロップ

服用に当たって、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
短期間の服用にとどめ、連用しないでください。

☒ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4)胃腸の弱い人。(5)発汗傾向の著しい人。(6)高齢者。(7)今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。(8)次の症状のある人。むくみ、排尿困難 (9)次の診断を受けた人。高血圧、心臓病、腎臓病、甲状腺機能障害。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気、食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診察を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あられ、徐々に強くなる。
肝 機 能 障 害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、 全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 かげの初期症状(発熱、さむけ、頭痛、鼻水、鼻づまり、のどの痛み、肩・首筋のこわばり)

用法・用量 次の量を1日3回食間に服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1本	3回
15歳未満	服用しないこと	

定められた用法・容量を厳守してください。

成分・分量 3本(90mL)〔大人1日服用量〕中、次の成分を含有します。

成 分	3本中
葛根湯エキス(カッコン8g、マオウ4g、タイソウ4g、ケイヒ3g、ジャクヤク3g、 カンゾウ2g、ショウキョウ1gより得た軟エキス)	8.3g

添加物として、白糖、D-ソルビトール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、香料(β-メントール)を含有します。

保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

発売元 本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元 大生堂薬品工業株式会社

岐阜市六条大溝3丁目3番17号

