

貯 法：室温保存  
有効期間：3年

## 漢方製剤

承認番号	16100AMZ04157000
販売開始	1986年10月

## 劇薬 本草八味丸料エキス顆粒－M

(500g/バラ包装のみ劇薬)

## 3. 組成・性状

## 3.1 組成

販売名	本草八味丸料エキス顆粒－M
有効成分	本品7.5g中（3包中） 日局ジオウ……………5.0g 日局ボタンビ……………3.0g 日局サンシュユ……………3.0g 日局ケイヒ……………1.0g 日局サンヤク……………3.0g 日局ブクリョウ……………3.0g 日局タクシヤ……………3.0g 日局ブシ末……………1.0g より製した水製乾燥エキス4.4gを含有する。
添加剤	乳糖水和物、結晶セルロース、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウム

## 3.2 製剤の性状

剤形	顆粒剤
色調	淡かつ色
識別コード	H07
におい	特異なおい
味	初めやや甘く後にわずかに苦い

## 4. 効能又は効果

疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少または多尿で、ときに口渇がある次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、老人のかすみ目、かゆみ、排尿困難、頻尿、むくみ。

## 6. 用法及び用量

通常成人は1日7.5gを3回に分割し食前又は食間に経口投与する。  
なお、年齢、体重、症状により適宜増減する。

## 8. 重要な基本的注意

8.1 本剤の使用にあたっては、患者の証（体質・症状）を考慮して投与すること。なお、経過を十分に観察し、症状・所見の改善が認められない場合には、継続投与を避けること。

8.2 他の漢方製剤等を併用する場合は、含有生薬の重複に注意すること。ブシを含む製剤との併用には、特に注意すること。

## 9. 特定の背景を有する患者に関する注意

## 9.1 合併症・既往歴等のある患者

## 9.1.1 体力の充実している患者

副作用があらわれやすくなり、その症状が増強されるおそれがある。

## 9.1.2 暑がりで、のぼせが強く、赤ら顔の患者

心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ、悪心等があらわれることがある。

## 9.1.3 著しく胃腸の虚弱な患者

食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘等があらわれることがある。

## 9.1.4 食欲不振、悪心、嘔吐のある患者

これらの症状が悪化するおそれがある。

## 9.5 妊婦

妊婦又は妊娠している可能性のある女性には投与しないことが望ましい。本剤に含まれるボタンビにより流産の危険性があり、またブシ末の副作用があらわれやすくなる。

## 9.6 授乳婦

治療上の有益性及び母乳栄養の有益性を考慮し、授乳の継続又は中止を検討すること。

## 9.7 小児等

慎重に投与すること。本剤にはブシ末が含まれている。

## 9.8 高齢者

減量するなど注意すること。一般に生理機能が低下している。

## 11. 副作用

次の副作用があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には投与を中止するなど適切な処置を行うこと。

## 11.2 その他の副作用

	頻度不明
過敏症	発疹、発赤、痒痒等
肝臓	肝機能異常（AST、ALT、T-Bil等の上昇）
消化器	食欲不振、胃部不快感、悪心、嘔吐、腹痛、下痢、便秘等
その他	心悸亢進、のぼせ、舌のしびれ等

## 20. 取扱い上の注意

20.1 本剤の品質を保つため、できるだけ湿気を避け、直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。

20.2 開封後は特に湿気を避け、取扱いに注意すること。

20.3 本剤は生薬を原料としているので、色調等が異なることがある。

## 22. 包装

500g（バラ包装）[ボトル]

735g（2.5g×294包）[分包]

105g（2.5g×42包）[分包]

## 24. 文献請求先及び問い合わせ先

本草製薬株式会社 学術部

〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地

TEL 052-892-1287 FAX 052-895-4928

## 26. 製造販売業者等

## 26.1 製造販売元

本草製薬株式会社

名古屋市天白区古川町125番地